

Boletín educativo para el paciente

Procedimientos médicos/Pruebas diagnósticas

Ecocardiograma Transesofágico (TEE)

Se le ha programado un electrocardiograma transesofágico (TEE, por sus siglas en inglés), el cual es una prueba diagnóstica que utiliza ondas de sonido para que los médicos puedan observar su corazón por dentro. Durante esta prueba, un doctor lo ayudará a introducir dentro de su garganta un tubo flexible. Este tubo pasará a través de la garganta y hacia el esófago, donde será utilizado para obtener imágenes de su corazón.

Preparación:

- No consuma ninguna bebida, ni siquiera agua, durante las 8 horas previas a la prueba. Su doctor le indicará si debe tomar su medicamento habitual el día de la prueba.
- Comuníquese a su doctor si sufre de alguna alergia o si alguna vez tuvo problemas para tragar. También infórmele si usted está embarazada.
- Vístase con ropa cómoda.
- Si usted es un paciente ambulatorio, asegúrese de que alguien lo lleve a su casa después de la prueba.

Procedimiento:

- Antes que comience la prueba, informe a la enfermera o al doctor si usted usa dentadura postiza.
- Le colocarán en el brazo un catéter intravenoso, por donde le serán administrados los líquidos y los medicamentos.
- Si le han reemplazado una válvula cardíaca, le podrían aplicar un antibiótico antes del procedimiento para evitar una infección.
- Durante la prueba se revisará su ritmo cardíaco, presión sanguínea, respiración y nivel de oxígeno.
- Primero, el doctor le adormecerá la garganta con anestésico en spray, para disminuir su sensación de vomitar y ayudarlo a tragar el tubo. También se le dará un sedante a través del catéter intravenoso para que usted pueda relajarse.
- Se le colocará un "protector bucal" entre los dientes (una pieza pequeña de plástico con un agujero en el medio), con el fin de mantener su boca abierta durante la prueba.
- Se le pedirá que se recueste sobre su lado izquierdo y descance su mentón sobre el pecho. Una vez se encuentre en esa posición, el doctor pasará un tubo a través del agujero del protector bucal y le pedirá que trague. Es posible que sienta que se atora, pero ésta sensación desaparecerá en cuanto el tubo se encuentre en su lugar. Durante el procedimiento también se estará succionando la saliva.
- La prueba durará de 15 a 20 minutos.

Después del procedimiento:

- Su garganta puede quedar levemente dolorida por unas cuantas horas.
- Le pueden indicar que no coma ni beba por casi 4 horas o hasta que su reflejo para tragar vuelva a la normalidad. Cuando vuelva a tener completa sensibilidad en su garganta, comience a tomar pequeños sorbos de agua. Si puede tragarlos fácilmente, puede volver a comer y beber como lo hace habitualmente.
- Si le realizan esta prueba como paciente ambulatorio, asegúrese que alguien lo lleve de regreso a su casa.

Instrucciones especiales

Empty box for special instructions.

Esta información ha sido preparada específicamente para los pacientes que participan en protocolos de investigación clínica en el Centro Clínico de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) y puede no ser pertinente para pacientes de otros lugares. Si tiene alguna pregunta sobre la información presentada aquí, hable con un miembro de su equipo de atención médica.

National Institutes of Health Clinical Center
Bethesda, MD 20892

¿Tiene preguntas sobre el Centro Clínico?
<http://www.cc.nih.gov/comments.shtml>

4/09

La mención de nombres de productos o recursos se hace solamente para dar ejemplos y no implica la promoción de los mismos por parte de NIH. El hecho de que no se mencione el nombre de un producto o recurso no implica que ese producto o recurso no sea satisfactorio.

