



Dexrazoxane (Zinecard®)

En el Centro Clínico es referido como Dexrazoxane (pronunciado en inglés: Dex-ra-ZOX-ane).

Cómo Se Administra	Intravenosamente (por una vena)
Mecanismo de Acción del Fármaco	El dexrazoxane puede proteger al corazón de efectos dañinos causados por ciertos medicamentos para el cáncer.
Efectos Secundarios	<ol style="list-style-type: none">1. Los efectos sobre la médula ósea pueden incluir una disminución temporal de glóbulos blancos.2. Pueden ocurrir náusea y vómito.
Instrucciones Especiales	<ol style="list-style-type: none">1. No tome aspirina o productos que contienen aspirina a menos que sean recetados por su médico del NIH.2. Llame a su médico o enfermera del NIH si usted:<ul style="list-style-type: none">• no puede tomar líquidos por más de 1 día o no puede comer por más de 2 días después del tratamiento• tiene una temperatura de 101.0 °F (38.3 °C) en cualquier momento o tiene una temperatura de por lo menos 100.4 °F (38.0 °C) que dure 1 hora o que ocurra dos veces en un periodo de 24 horas



Esta información es preparada específicamente para pacientes que participan en la investigación clínica en el Centro Clínico Warren Grant Magnuson de los Institutos Nacionales de Salud y no es necesariamente aplicable a individuos que son pacientes en otra parte. Si tiene preguntas acerca de la información que se presenta aquí, hable con un integrante de su equipo de atención médica.

Series Viviendo con Quimioterapia para el Cáncer
Octubre de 1999, Borrador; Aprobación, Febrero del 2001
Institutos Nacionales de Salud, Departamento de Enfermería del CC