



Asparaginasa (Elspar®)

En el Centro Clínico es referido como Asparaginasa (en inglés, Asparaginase, con pronunciación: a-SPAR-a-gin-ase).

Cómo se Administra:	Cómo Se Administra: Intramuscularmente (por inyección en el músculo) e intravenosamente (por una vena).
Mecanismo de Acción del Fármaco:	La Asparaginasa interfiere con los bloques edificadores de las proteínas. Las células del cáncer necesitan estos bloques edificadores para su crecimiento.
Efectos Secundarios:	<ol style="list-style-type: none">1. Pueden ocurrir náusea y vómito dentro de las 4 a 6 horas posteriores al tratamiento.2. Puede ocurrir pérdida de peso.3. Puede ocurrir una fiebre no elevada (menos de 101.3 °F ó 38.5 °C) o escalofríos dentro de las 24 horas posteriores a recibir el medicamento (fármaco). Hable con su médico o enfermera acerca de cómo utilizar medicamentos para el control de la fiebre no elevada mientras que recibe la Asparaginasa.4. Pueden ocurrir reacciones alérgicas.5. Puede ocurrir enrojecimiento sin dolor en el sitio de inyección.6. Pueden ocurrir fatiga, somnolencia y confusión.7. La Asparaginasa puede afectar a su páncreas e hígado. Se realizarán pruebas para monitorear este efecto.
Instrucciones Especiales:	<ol style="list-style-type: none">1. Dígale a su enfermera inmediatamente si tiene comezón, urticaria, erupción, cambios en la respiración o si se siente mareado(a).2. No tome aspirina o productos que contienen aspirina a menos que sean recetados por su médico del NIH.3. Llame a su médico o enfermera del NIH si usted:

- tiene inflamación o dolor en el sitio de inyección
- no puede tomar líquidos por más de 1 día o no puede comer por más de 2 días después del tratamiento
- tiene dolor en su abdomen
- tiene mucha sed y necesita vaciar su vejiga frecuentemente
- tiene coloración amarilla de sus ojos o piel, comezón u orina oscura
- tiene algún sangrado o magulladura fuera de lo común.



Esta información es preparada específicamente para pacientes que participan en la investigación clínica en el Centro Clínico Warren Grant Magnuson de los Institutos Nacionales de Salud y no es necesariamente aplicable a individuos que son pacientes en otra parte. Si tiene preguntas acerca de la información que se presenta aquí, hable con un integrante de su equipo de atención médica.

Series Viviendo con Quimioterapia para el Cáncer
Enero de 1983; Borrador, Febrero del 2000;
Aprobado, Febrero del 2001
Institutos Nacionales de Salud, Departamento de
Enfermería del CC