



Lobramilo (Lobramil, RMP-7, Cereport®)

En el Centro Clínico es referido como Lobramilo.

Cómo se Administra:	Intravenosamente (por vena)
Mecanismo de Acción del Fármaco:	La barrera hematoencefálica actúa como una puerta que previene que muchos medicamentos no lleguen al cerebro. El Lobramilo temporalmente abre esta puerta, lo cual permite que entren al cerebro ciertos medicamentos de quimioterapia.
Efectos Secundarios:	<ol style="list-style-type: none">1. Puede ocurrir una disminución en la presión sanguínea con el inicio de la infusión y puede durar hasta una hora después de que la infusión termine. Esto puede causar mareos y aturdimiento.2. Los siguientes síntomas pueden ocurrir con el inicio de la infusión y por lo general desaparecen al finalizar la infusión:<ul style="list-style-type: none">• enrojecimiento facial, sensación de acaloramiento• dolor de cabeza severo• dolor de estómago• náusea y vómito severo• necesidad urgente de orinar.
Instrucciones Especiales:	<ol style="list-style-type: none">1. Dígale a su enfermera inmediatamente si experimenta mareos, aturdimiento, Enrojecimiento facial, una sensación de acaloramiento, dolor de cabeza, dolor de estómago, náusea o vómito.



Esta información es preparada específicamente para pacientes que participan en la investigación clínica en el Centro Clínico Warren Grant Magnuson de los Institutos Nacionales de Salud y no es necesariamente aplicable a individuos que son pacientes en otra parte. Si tiene preguntas acerca de la información que se presenta aquí, hable con un integrante de su equipo de atención médica.

Series Viviendo con Quimioterapia para el
Cáncer Borrador/Septiembre de 1998
Institutos Nacionales de Salud, CC
Departamento de Enfermería