



## Raltitrexed (Tomudex®)

*En el Centro Clínico es referido como Raltitrexed (pronunciado en inglés: rol-tih-TREX-ed).*

<b>Cómo se Administra:</b>	Intravenosamente (por una vena)
<b>Mecanismo de Acción del Fármaco:</b>	Raltitrexed bloquea una proteína que las células del cáncer necesitan para copiar y reparar el ADN. El ADN es el material genético de las células que es utilizado para formar nuevas células.
<b>Efectos Secundarios:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Los efectos sobre la médula ósea pueden incluir una disminución temporal de glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos.</li><li>2. Pueden ocurrir náusea leve y vómito.</li><li>3. Puede ocurrir diarrea.</li><li>4. Pueden ocurrir úlceras en los labios, garganta y boca.</li><li>5. Puede ocurrir una erupción en la piel.</li><li>6. Pueden ocurrir síntomas de tipo gripal (“flu”) leve. Los síntomas incluyen fiebre, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza y fatiga.</li><li>7. Raltitrexed puede dañar a su hígado. Se realizarán pruebas para verificar o determinar este efecto. El daño al hígado cesará cuando se suspenda el medicamento.</li></ol>
<b>Instrucciones Especiales:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. No tome ninguna vitamina a menos que sea recetada por su médico del NIH.</li><li>2. No tome aspirina o productos que contienen aspirina a menos que sean recetados por su médico del NIH.</li><li>3. Tome medicamentos para la náusea según se le indicó.</li></ol>

4. Llame a su médico o enfermera del NIH si usted:

- tiene heces sueltas o diarrea
- tiene una temperatura de 101.0 °F (38.3 °C) en cualquier momento o tiene una temperatura de por lo menos 100.4 °F (38.0 °C) que dure 1 hora o que ocurra dos veces en un periodo de 24 horas
- tiene algún sangrado o magulladura fuera de lo común
- no puede tomar líquidos por más de 1 día o no puede comer por más de 2 días después del tratamiento



Esta información es preparada específicamente para pacientes que participan en la investigación clínica en el Centro Clínico Warren Grant Magnuson de los Institutos Nacionales de Salud y no es necesariamente aplicable a individuos que son pacientes en otra parte. Si tiene preguntas acerca de la información que se presenta aquí, hable con un integrante de su equipo de atención médica.

Series Viviendo con Quimioterapia para el Cáncer  
Febrero del 2000, Borrador;  
Aprobación, Febrero del 2001  
Institutos Nacionales de Salud, Departamento de  
Enfermería del CC