



Après votre transfusion sanguine

Instructions pour patients en consultation externe

Vous pouvez reprendre vos activités normales au bout de 4 à 6 heures après votre transfusion sanguine. Les réactions suite à une transfusion sanguine peuvent être retardées.

- Si vous développez de la fièvre, avec ou sans frissons, au cours des prochaines 48 heures, il se peut que vous subissiez une réaction tardive à la transfusion.
- Si vous remarquez une urine sombre, une peau jaunâtre ou si vous vous sentez anormalement fatigué(e) au cours des 2 semaines qui suivent, il se peut que vous subissiez une réaction tardive à la transfusion.

Si vous pensez subir une réaction tardive à la transfusion, contactez immédiatement un membre de votre équipe de soins de santé.

Nom : _____

Numéro de téléphone : _____



8/1/03

This information is prepared specifically for patients participating in clinical research at the Warren Grant Magnuson Clinical Center at the National Institutes of Health and is not necessarily applicable to individuals who are patients elsewhere. If you have questions about the information presented here, talk to a member of your healthcare team.

Questions about the Clinical Center? OCCC@cc.nih.gov

Where applicable, brand names of commercial products are provided only as illustrative examples of acceptable products, and do not imply endorsement by NIH; nor does the fact that a particular brand name product is not identified imply that such product is unsatisfactory.

National Institutes of Health
Warren Grant Magnuson Clinical Center
Bethesda, Maryland 20892