

Patient Education

Clinical Center
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH

Sau khi được truyền máu Chỉ dẫn cho bệnh nhân ngoại chẩn

Quý vị có thể tiếp tục các sinh hoạt bình thường của mình trong vòng từ 4 đến 6 tiếng sau khi được truyền máu. Các phản ứng khi được truyền máu có thể xảy ra chậm.

- Nếu bắt đầu bị sốt cùng cảm thấy bị lạnh hoặc không bị lạnh trong vòng 48 tiếng, quý vị có thể đang bị phản ứng chậm khi được truyền máu.
- Nếu thấy nước tiểu có màu đậm, da vàng, hoặc bị mệt bất thường trong vòng 2 tuần kế tiếp, quý vị có thể bị phản ứng chậm khi được truyền máu.

Nếu nghĩ rằng mình bị phản ứng chậm khi được truyền máu, xin gọi nhân viên nhóm chăm sóc sức khỏe của quý vị ngay.

TÊN: _____

SỐ ĐIỆN THOẠI: _____

This information is prepared specifically for persons taking part in clinical research at the National Institutes of Health Clinical Center and may not apply to patients elsewhere. If you have questions about the information presented here, talk to a member of your health care team.

Products/resources named serve as examples and do not imply endorsement by NIH. The fact that a certain product/resource is not named does not imply that such product/resource is unsatisfactory.

National Institutes of Health Clinical Center
Bethesda, MD 20892
1999

Questions about the Clinical Center?

<http://www.cc.nih.gov/comments.shtml>

