

## بعد خضوعك لعملية نقل الدم تعليمات للمريض الخارجي غير المقيم في المستشفى

قد تواصل نشاطاتك الاعتيادية بعد مرور من ٤ حتى ٦ ساعات على خضوعك لعملية نقل الدم. وقد تأتي ردات فعل عملية نقل الدم متأخرة.

■ إذا أصبت بالحمى المقرونة بالقشعريرة أو غير المقرونة بها خلال الساعات الثماني والأربعين التالية، فإنك قد تكون تبدي ردة فعل متأخرة على عملية نقل الدم.

■ إذا لاحظت البول الداكن أو إصفراراً في البشرة أو شعرت بتعب غير اعتيادي خلال الأسبوعين التاليين، فإنك قد تكون تبدي ردة فعل متأخرة على عملية نقل الدم.

إذا كنت تعتقد أنك تبدي ردة فعل متأخرة على عملية نقل الدم، اتصل فوراً بأحد أفراد الفريق المعني برعايتك الصحية.

الاسم: \_\_\_\_\_

رقم الهاتف: \_\_\_\_\_

This information is prepared specifically for persons taking part in clinical research at the National Institutes of Health Clinical Center and may not apply to patients elsewhere. If you have questions about the information presented here, talk to a member of your health care team.

Products/resources named serve as examples and do not imply endorsement by NIH. The fact that a certain product/resource is not named does not imply that such product/resource is unsatisfactory.

National Institutes of Health Clinical Center  
Bethesda, MD 20892  
1999

Questions about the Clinical Center?  
<http://www.cc.nih.gov/comments.shtml>

