

Boletín educativo para el paciente

Procedimientos/Pruebas de Diagnóstico- Ala 3 Suroeste Norte Cuidados después de una Sigmoidoscopia

La intervención fue llevada a cabo por el/la: Dr. /Dra. _____ el _____

- Continúe su dieta regular, a menos que su médico le indique lo contrario.
- Continúe con todos sus medicamentos, a menos que su médico le indique lo contrario. Su médico le dará instrucciones específicas para determinar si debe continuar su régimen de medicinas anti-inflamatorias y anti-coagulantes y cuando debe hacerlo.

Si usted recibió sedantes durante su intervención,

- 1. No conduzca un automóvil ni opere maquinaria pesada por un mínimo de 24 horas después del procedimiento.** Los sedantes pueden interferir con su habilidad para concentrarse ó de reaccionar rápidamente, por lo tanto sería peligroso.
- 2. No consuma bebidas alcohólicas por 24 horas.** La combinación del alcohol y sedantes puede afectar su cuerpo de tal manera que podría ser peligroso para su salud.
- 3. No tome decisiones importantes, no firme contratos ó documentos legales durante las próximas 24 horas.** Es posible que no pueda pensar claramente debido a que los sedantes desaceleran su cuerpo y mente.
- 4. ¡¡¡REPOSE!!!** Durante su intervención se le dieron sedantes que pueden hacerle sentir cansado ó mareado.

Después de la intervención, podría presentar cualquiera de los siguientes síntomas:

- Leve incomodidad ó sangrado rectal.
- Acumulación de gases, hinchazón ó calambres (NO TOME Alka-Seltzer).

Llame a su médico **INMEDIATAMENTE** al número de emergencia indicado abajo, si presenta alguno de los siguientes síntomas:

- Fiebre ó escalofríos
- Sangrado continuo al defecar
- Dolor abdominal severo
- Mareos severos, debilidad ó ritmo cardíaco acelerado
- Dificultad para respirar
- Incapacidad para alimentarse
- Náusea severa y vómito
- Cualquier dolor inusual ó problema
- Dolor ó enrojecimiento en al área en la que se colocó el acceso intravenoso.

En caso de emergencia:

Llame a su médico **INMEDIATAMENTE** a través de la operadora de localización de NIH al (301) 496-1211. Durante horas hábiles, por favor llame al (301) 451-0336 y pida comunicarse con la enfermera de Gastroenterología.

Si tiene alguna pregunta con respecto a estas instrucciones, por favor llame al (301) 451-0336 durante horas hábiles (de 6:00 am a 6:00 pm, Lunes a Viernes) y pida comunicarse con la enfermera de Gastroenterología.

Esta información ha sido preparada específicamente para personas que toman parte de investigaciones clínicas en el Centro Clínico de los Institutos Nacionales de la Salud y puede que no se aplique a otros pacientes. Si tiene preguntas sobre la información aquí presentada comuníquese con un miembro de su equipo de atención médica.

Los productos/recursos mencionados sirven como ejemplos y no implican un aval de parte de los NIH. El hecho de que cierto producto/recurso no sea mencionado no implica que sea insatisfactorio.

National Institutes of Health Clinical Center
Bethesda, MD 20892

¿Preguntas sobre el Clinical Center?
<http://www.cc.nih.gov/comments.shtml>

<http://www.cc.nih.gov/comments.shtml>

12/11

