



Instrucciones después de una biopsia o aspiración de médula ósea

Durante el procedimiento de la médula ósea, el médico inyectará un anestésico local en el lugar de la biopsia para mantenerlo cómodo. A medida que pasa el efecto de la anestesia, usted puede sentir algo de dolor en el lugar durante 2 o 3 días. Si siente dolor, tome los medicamentos recetados o use Tylenol.

No remueva por 24 horas el vendaje compresivo que le pusieron
Mantenga el lugar limpio y seco durante 24 horas.

Por favor preste atención a lo siguiente durante la cicatrización:

Notifique si hay sangrado excesivo proveniente del lugar
Notifique si hay dolor severo en el lugar

Otras instrucciones:

Contactos (Comuníquese con los miembros del personal que hay en la lista de abajo llamando al operador de buscapersonas de los NIH al 301-496-1211)

Horas de atención: lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4 p.m.

Médico/Médico general

Enfermera o enfermero de hematología

Después de horas de trabajo, llame al: **301-496-5842.**



2005

¿Tiene preguntas acerca del Centro Clínico? OCCC@cc.nih.gov

Esta información está preparada específicamente para los pacientes que participan en la investigación clínica en el Centro Clínico en los Institutos Nacionales de Salud y no es necesariamente aplicable a los individuos que son pacientes en otra parte. Si tiene alguna pregunta acerca de la información presentada aquí, hable con un miembro de su equipo de atención médica.

En donde sea aplicable, los nombres patentados de productos comerciales se proporcionan solamente como ejemplos ilustrativos de productos aceptables y no implica un respaldo por parte del NIH para dichos productos; ni tampoco el hecho de que el nombre de un producto de patente en particular no se identificó implica que dicho producto no sea satisfactorio.

El Centro Clínico de los
Institutos Nacionales de Salud
Bethesda, MD 20892